



**CONCOURS D'ACCES A LA GRANDE ECOLE**

**ANNEE 2014**

**MATHEMATIQUES I**

**DUREE : 3 heures**

**N.B :**

1. Il n'est fait usage d'aucun document; l'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.
2. Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.
3. Les téléphones portables sont strictement interdits et doivent être éteints.
4. Les réponses aux questions devront être portées sur la grille distribuée en complément du sujet.
5. Il ne sera admis qu'une seule réponse par question.
6. Le barème suivant sera adopté:

Réponse correcte: +2

Réponse fausse: -1

Pas de réponse: 0

Il y a 20 questions totalement indépendantes.

**Question 6:** Soient 2 dés A et B à 6 faces équiprobables. Le dé A a pour faces 2 ; 6 ; 2 ; 6 ; 2 ; 2, et le dé B a pour faces 1 ; 5 ; 1 ; 5 ; 1 ; 5.

Deux joueurs J1 et J2 s'affrontent et lancent chacun un dé. Le gagnant est celui dont le dé montre la face qui comporte le chiffre le plus grand.

Si J1 joue avec le dé A, et J2 avec le dé B, alors J1 a une probabilité de gagner égale à :

- A)  $\frac{1}{3}$  ; B)  $\frac{1}{2}$  ; C) 1 ; D)  $\frac{2}{3}$  ; E) Autre réponse

**Question 7:** Soit  $f$  la fonction réelle polynomiale définie par  $f(x) = 6x^4 + 5x^3 - 38x^2 + 5x + 6$ . On note  $x_1$  (respectivement  $x_2$ ) la plus petite (respectivement plus grande) solution réelle de l'équation  $f(x) = 0$ , alors  $x_1 + x_2 =$

- A) -3 ; B) -2 ; C) -1 ; D) 0 ; E) Autre réponse

**Indication:** On pourra songer à effectuer le changement de variable  $t = x + \frac{1}{x}$  et on pourra utiliser le calcul

suivant:  $35^2 = 1225$

**Question 8:** On pose pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :  $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(k^2 - 1)2^k}{k!}$

$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n =$

- A)  $5e^2$  ; B)  $\frac{2}{5}$  ; C)  $\frac{e^2 - 1}{2}$  ; D)  $+\infty$  ; E) Autre réponse

**Question 9:** Une urne  $U_1$  contient 3 boules rouges et 5 vertes  
Une urne  $U_2$  contient  $n$  boules rouges, 3 vertes et 2 blanches

On tire au hasard une boule de  $U_1$ , puis on la jette dans  $U_2$ . On tire ensuite au hasard deux boules de  $U_2$ .

Si on tire deux boules rouges de  $U_2$ , on gagne 50 dirhams

Si on tire deux boules vertes de  $U_2$ , on gagne 20 dirhams

Si on tire deux boules blanches de  $U_2$ , on gagne 10 dirhams

Si on tire deux boules de couleurs différentes de  $U_2$ , on perd 20 dirhams

Soit  $X$  la variable aléatoire « gain en dirhams à l'issue d'une telle épreuve »

L'espérance de  $X$  est

- A)  $\frac{5(4n^2 - 19n - 12)}{4(n+5)(n+6)}$  B)  $\frac{5(4n^2 - 14n - 12)}{4(n+5)(n+6)}$  C)  $\frac{5(4n^2 - 17n - 12)}{4(n+5)(n+6)}$  D)  $\frac{5(3n^2 - 19n - 12)}{4(n+5)(n+6)}$  E) Autre réponse

**Question 10:** La durée de fonctionnement moyenne d'un téléviseur d'une référence donnée avant sa première panne est de 10 ans. On suppose que la variable aléatoire  $T$  définissant la durée de vie de ce téléviseur (temps écoulé entre sa mise en service et sa première panne) a pour densité de probabilité la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{10} e^{-\frac{t}{10}} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

La probabilité que le téléviseur n'ait pas de panne pendant 12 ans, sachant qu'il n'en a pas pendant 4 ans est:

- A)  $\frac{e}{3}$  ; B)  $\frac{1}{2}$  ; C)  $\frac{1}{3}$  ; D)  $e^{-0,8}$  ; E) Autre réponse

**Question 11:** Pour tout entier naturel  $n$ , on note:

$$I_n = \int_0^1 e^{-x^2} (1-x)^n dx \quad \text{et} \quad J_n = \int_0^1 x e^{-x^2} (1-x)^n dx$$

Pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , on a:

- A)  $I_n = \frac{1}{n+1} (1 - 2J_{n+1})$       B)  $I_n = \frac{1}{n+1} (2 - 3J_{n+1})$       C)  $I_n = \frac{1}{n+1} (3 - 4J_{n+1})$   
D)  $I_n = \frac{1}{n+1} (4 - 5J_{n+1})$       E) Autre réponse

**Question 12:** Soit  $f$  la fonction réelle de la variable réelle  $x$  définie sur  $D = ]0; 1[ \cup ]1; +\infty[$  par

$f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$ . Alors  $f$  est dérivable sur  $D$ , et pour tout  $x \in D$  sa dérivée  $f'(x)$  est:

- A)  $\frac{x}{\ln x}$       B)  $\frac{x-1}{\ln x}$       C)  $\frac{x^2-1}{\ln x}$       D)  $\frac{x^2}{\ln x}$       E) Autre réponse

**Question 13:** Une entreprise produit des objets sur deux chaînes de montage  $C_1$  et  $C_2$  qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Pour une chaîne donnée, les fabrications des pièces sont indépendantes. La chaîne  $C_1$  produit 60 % des objets et la chaîne  $C_2$  produit 40 % des objets. La probabilité qu'un objet construit par la chaîne  $C_1$  soit défectueux est 0,1 alors que la probabilité pour qu'un objet construit par la chaîne  $C_2$  soit défectueux est 0,2. On choisit au hasard un objet à la sortie de l'entreprise. On constate que cet objet est défectueux. La probabilité de l'événement "l'objet provient de la chaîne  $C_1$ " est égale à:

- A)  $\frac{2}{3}$       B)  $\frac{1}{3}$       C)  $\frac{4}{17}$       D)  $\frac{3}{8}$       E) Autre réponse

**Question 14:** Des enfants s'entraînent à réussir des paniers de basket. Pour chacun d'eux, indépendamment les uns des autres et des essais successifs, la probabilité de réussite d'un panier est  $p$  ( $p \in ]0; 1[$ )

Hamza est l'un de ces enfants; soit  $N$  le nombre d'essais que va faire Hamza.

La condition nécessaire et suffisante pour que la probabilité qu'il réussisse au moins un panier soit supérieure ou égale à  $1-\alpha$  ( $\alpha \in ]0; 1[$ ), est

- A)  $N \geq \frac{\ln \alpha}{\ln p}$       B)  $N \geq \frac{\ln(1-\alpha)}{\ln p}$       C)  $N \geq \frac{\ln \alpha}{\ln(1-p)}$       D)  $N \geq \frac{\ln(1-p)}{\ln \alpha}$       E) Autre Réponse

**Question 15:** La nuit dans la savane, un lion se rend à la rivière pour boire et y reste un quart d'heure. Après de nombreuses observations, on estime que l'instant  $T$  d'arrivée du lion se situe entre 0 heure et 2 heures. On admet que  $T$ , exprimée en heures, est une variable aléatoire dont une densité de probabilité est la fonction  $f$  définie par:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \notin [0;2] \\ ct(2-t) & \text{si } t \in [0;2] \end{cases} \quad \text{où } c \text{ est une constante (éventuellement à calculer).}$$

Un observateur se présente à la rivière à 0heure 30minutes et y reste un quart d'heure. La probabilité qu'il aperçoive le lion est:

- A)  $\frac{33}{128}$       B)  $\frac{35}{128}$       C)  $\frac{1}{4}$       D)  $\frac{45}{128}$       E) Autre réponse

**Question 16:** Soient  $f$  et  $g$  les fonctions numériques de la variable réelle définies sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad \text{et} \quad g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

Pour tout réel  $\lambda$  strictement positif, on note  $A(\lambda)$  l'aire ( exprimée en unité d'aire ) du domaine constitué par l'ensemble des points  $M(x, y)$  tels que :

$$\lambda \leq x \leq 2\lambda \quad \text{et} \quad 0 \leq y \leq f(x)$$

Après avoir calculé la dérivée  $g'(x)$ , on déduit que la limite de  $A(\lambda)$  lorsque  $\lambda$  tend vers  $+\infty$  est égale à:

- A)  $\ln 3$       B)  $\ln 2$       C)  $\frac{1}{2}$       D)  $\frac{\ln 3}{2}$       E) Autre réponse

**Question 17:** Soit  $X$  une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur  $[0,1]$ .

On pose  $Y = X^2$

On considère le réel  $a \in [0,1]$  tel que  $P(Y \leq a) = P(Y > a)$ .

$a$  est égal à:

- A)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  ;    B)  $-\frac{1}{2}$  ;    C)  $\frac{1}{4}$  ;    D)  $\frac{1}{2}$  ;    E) Autre réponse

**Question 18:** On étudie le mouvement aléatoire d'une puce. Cette puce se déplace sur trois cases notées A, B et C.

A l'instant 0, la puce est en A.

Pour tout entier naturel n :

- Si à l'instant n la puce est en A, alors à l'instant (n+1), elle est soit en B avec une probabilité égale à  $\frac{1}{3}$  ; soit en C avec une probabilité égale à  $\frac{2}{3}$ .
- Si à l'instant n la puce est en B, alors à l'instant (n+1), elle est soit en C soit en A de façon équiprobable.
- Si à l'instant n la puce est en C, alors elle y reste.

On note  $A_n$  (respectivement  $B_n, C_n$ ) l'évènement « à l'instant n la puce est en A » (respectivement en B, en C).

On note  $a_n$  (respectivement  $b_n, c_n$ ) la probabilité de l'évènement  $A_n$ , (respectivement  $B_n, C_n$ ).  
Alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n =$

- A) 0    B) 1    C) ln 2    D)  $\frac{1}{2}$     E) Autre réponse

**Question 19:** On considère la matrice carrée d'ordre 3:  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

Soit  $X \in M_{31}(\mathbb{R})$  un vecteur-colonne de  $\mathbb{R}^3$ .

On définit la matrice P avec les propriétés suivantes:

- Les termes diagonaux de P sont tous égaux à 1.
- La première colonne de P est une solution non nulle de  $AX = 0$
- La deuxième colonne de P est une solution non nulle de  $AX = X$
- La troisième colonne de P est une solution non nulle de  $AX = 4X$

On vérifie que P est inversible. La matrice inverse  $P^{-1}$  est alors égale à:

- A)  $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$     B)  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$     C)  $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$     D)  $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

E) Autre réponse

**Question 20:** On désigne par  $\lambda$  un réel strictement positif et on considère la fonction f, définie sur  $\mathbb{R}$ , par :  
 $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \lambda|x|e^{-\lambda x^2}$

La fonction f peut être considérée comme densité d'une variable aléatoire X si  $\lambda$  est égal à :

- A) 1    B)  $\frac{1}{2}$     C) ln 2    D)  $\frac{3}{4}$     E) Autre réponse